

2018 წელი

აგრომეტეოროლოგიური ბიულეტენი

№27 სექტემბრის მესამე დეკადა



გამოდის 1931 წლიდან

გარემოს ეროვნული სააგენტო

სარჩევი

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი.....	2
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარებისა და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები	2
2018 წლის სექტემბრის მესამე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები.....	3
აღმოსავლეთ საქართველო.....	
დასავლეთ საქართველო.....	13

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი

სექტემბრის მესამე დეკადა ქვეყნის ტერიტორიაზე თბილი და ნალექიანი ამინდით ხასიათდებოდა.

ჰაერის საშუალო დეკადური ტემპერატურა მრავალწლიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2-3° -ით მაღალი აღმოჩნდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და შეადგინა: 19-21° დასავლეთ საქართველოში, 17-21° აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, 13-16° აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 28-35° , აღმოსავლეთ საქართველოში 24-32° , ფარგლებში მერყეობდა.

ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 7-15° , აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 6-15° , აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში 1-7° -ის შუალედში ფიქსირდებოდა.

ნალექები განვლილ დეკადაში ძირითადად 1-5 დღის განმავლობაში მოდიოდა და მათი ჯამი ასე განაწილდა: 2-34მმ (მრავალწლიური ნორმის 7-45%) დასავლეთ საქართველოში, 1-35მმ (მრავალწლიური ნორმის 11-163%) აღმოსავლეთ საქართველოში.

ძლიერი ქარი (15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით) ქროდა 1-4 დღის განმავლობაში ქვეყნის ცალკეულ რაიონში.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები

დასავლეთ საქართველოში სექტემბრის მესამე დეკადაში მინდვრის სამუშაოების ჩასატარებლად კარგი პირობები იყო. მაღალი ტემპერატურული რეჟიმი ხელს უწყობდა ციტრუსის ნაყოფის დამსხვილებას და მასში შაქრის დაგროვებას. კარალიოკიზე და ფეიხოაზე სიმწიფის ფაზა აღინიშნა.

აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექი ამინდი ნაწილობრივ ხელს უშლიდა მინდვრის სამუშაოების ჩატარებას. ლაგოდეხის აგრომეტეოროლოგიური საგუშაგოს მონაცემებით მიმდინარეობს პამიდვრის მოსავლის აღება .

მთიან ზონაში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩასატარებლად დამაკმაყოფილებელი პირობები იყო. დაიწყო კარტოფილისა და კომბოსტოს მოსავლის მასიური აღება.

აღმოსავლეთ საქართველოს ზაფხულის საძოვრებზე საქონლის ძოვებისათვის. კარგი პირობები იყო.







2018 წლის სექტემბრის მესამე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები



სადგური	ჰაერის ტემპერატურა C°				მინიმალური ტემპერატურა ნიადაგის ზედაპირზე	ნალექები			ნალექიან დღეთა რიცხვი		დღეთა რიცხვი ქარით 15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით	ჰაერის საშუალო დეკადური შეფარდებითი ტენიანობა, %
	საშუალო დეკადური	გადახრა ნორმიდან	მაქსიმალური	მინიმალური		რაოდენობა მმ	რაოდენობა ნორმიდან %-ში	დღელამური მაქსიმუმი	1 მმ და მეტი	5 მმ და მეტი		
ქობულეთი	20,3	2,4	28	12		34	40	18	5	2	1	
ზუგდიდი	20,2	2,2	32	11		7	16	5	2	1		
მარტვილი												
ქუთაისი	21,1	1,9	32	14	13	10	26	5	3	1	1	77
ზესტაფონი	21,4	2,4	35	15		2	7	2	1		2	
საჩხერე	18,6	2,2	31	7		36	11	3	1			
ამბროლაური	19,3	2,4	31	9		6	22	6	1	1		
ხაშური(აგარა)	17,3	2,4	30	8		5	38	3	2			
გორი	18,2	2,3	30	6		3	25	2	2		4	73
თიანეთი	14,8	2,2	24	7		16	94	9	3	2		
ფასანაური	15,1	2,2	24	7		20	80	11	3	2		
თბილისი	19,8	1,8	29	12	9	13	118	8	2	2	2	65
საგარეჯო	18,4	2,5	26	11		31	163	16	4	2		
დედოფლისწყარო	18,1	2,6	26	12		9	69	5	2	1		
თელავი	19,6	2,8	29	13		21	123	21	1	1		
ლაგოდეხი	21,1	3,1	30	15		35	117	30	2	2		
ბოლნისი	19,3	1,7	30	15	9							62
ახალციხე	15,8	1,9	32	5	3	1	11	1	1			70
წალკა	13,2	2,4	25	3								
ახალქალაქი	12,8	2,0	24	1		7	70	5	2	1		







აღმოსავლეთ საქართველო







































დასავლეთ საქართველო














კახეთის რეგიონში განთავსებული ავტომატური სადგურების
აგრომეტეოროლოგიური ინფორმაცია
2018 წლის სექტემბრის III დეკადა




ჩუმლაყი







ხორნაბუჯი




ზემო ქელი




ილიაწმინდა




საგარეო




შალაური



ქისტური



შილდა



ნაენდროვალი

განმარტებები

Vapor Press Deficit [mbar] - ორთქლის წნევის დეფიციტი (მილიბარი)

Solar Radiation [W/m²] - მზის რადიაცია (ვატი/მ²)

Dew Point [°C] - ნამის წერტილი (°C)

Air Temperature [°C] - ჰაერის ტემპერატურა (°C)

Rain fall [mm] - ნალექი (მმ)

Relative Humidity [%] – ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა (%)

Precipitation [mm] - ნალექი (მმ)

Leaf Wetness [min] - ფოთლის სისველე (წთ)

Wind Direction [deg.] - ქარის მიმართულება (გრად.)

Wind Speed Aver [m/s] - ქარის საშ. სიჩქარე (მ/წ)

Wind Speed Max. [m/s] - ქარის მაქს. სიჩქარე (მ/წ)

Daily ET₀ [mm] - დღიური ET₀ (ევაპოტრანსპირაცია, ჯამური აორთქლება) (მმ)

Water mark [cbar] – ნიადაგის ტენიანობა, გამოსახული წნევის ერთეულებით, (cbar), 30 და 60 სმ სიღრმეზე

Soil Temperature [°C] - ნიადაგის ტემპერატურა (°C), 30 და 60 სმ სიღრმეზე